


# PTAKI

Parku Krajobrazowego  
"Dolina Baryczy"

# CZAPLE




STAWY MILICKIE- KOMPLEKS JAMNIK  
MIEJSCE OBSERWACJI CZAPLI ●



STAWY MILICKIE- KOMPLEKS POTASZANIA  
MIEJSCE OBSERWACJI CZAPLI ●



STAWY MILICKIE- KOMPLEKS RADZIADZ  
MIEJSCE OBSERWACJI CZAPLI ●



STAWY MILICKIE- KOMPLEKS STAWNO  
MIEJSCE OBSERWACJI CZAPLI ●



Fot. Piotr Śnigucki



Dolnośląski Zespół  
Parków Krajobrazowych,  
ul. Puszczkowska 10,  
50-559 Wrocław  
www.dzpk.pl  
Wrocław 2015



## Czapla biała (*Egretta alba*)

Great White Egret, Grande Aigrette, Silberreiher

## Czapla siwa (*Ardea cinerea*)

Grey Heron, Héron cendré, Graureiher

Żywe włócznie stojące prawie nieruchomo w płytkiej wodzie i z uwagą wypatrujące zdobyczy. To czaple, cierpliwi, niestrudzeni łowcy.

### Czapla biała

Gniazdo w postaci szerokiej platformy buduje najczęściej w trzcinach, ale także i na drzewach. Budulcem są gałązki i sucha trzcina. Chętnie gniazduje kolonijnie, tworząc duże grupy. Jaja są wysiadywane na zmianę przez samca i samicę. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg. Młode ptaki opuszczają gniazdo po upływie około 6 tygodni. W naszym kraju jest nielicznym ptakiem lęgowym (do kilkudziesięciu par), do tej pory nie stwierdzono lęgów w Dolinie Baryczy, jednak licznie przylatuje. Ozdobne pióra wyrastają samcom i samicom w sezonie lęgowym. Ma długie, czarne nogi. Przeważnie nie wydaje głosów, gdy się zaniepokoi chrapliwie kracze. Bywa też dosyć głośna podczas godów i walk o terytorium.



Fot. Piotr Śnigucki

### Czapla siwa

Ma bardzo wąski, długi i ostry dziób, w żółtym kolorze. Często poluje stojąc na jednej nodze. Lata stosunkowo powoli, dostojnie machając skrzydłami, wydając chrapliwe wrzaski przypominające krakanie. Gniazda zakłada w koloniach, na wysokich drzewach, najchętniej takich, które porastają wyspy. Po wybraniu miejsca jeden z partnerów dostarcza materiału patyki, suche gałęzie a drugi pilnuje miejsca, bowiem inne czaple chętnie podkradają budulec. Jaja są wysiadywane przez 25 do 28 dni przez oba ptaki. Młode spędzają w gnieździe prawie 50 dni, potem 2-3 tygodnie w kolonii lęgowej, dokarmiane przez rodziców.



Fot. Piotr Śnigucki

### Pokarm:

Cz. biała drobne zwierzęta wodne, zwłaszcza owady, jeśli brakuje pokarmu - małe ssaki, węże i płazy. Potrafi podbierać zdobycz innym, mniejszym czaplom. Cz. siwa głównie ryby, łowi

też drobne skorupiaki i płazy, zimą małe gryzonie i nieduże ptaki.

### Waga:

Cz. biała 0,7 kg - 1,5 kg, Cz. siwa 1 kg - 2,1 kg

### Rozpiętość skrzydeł:

Cz. biała 140 cm - 170 cm, Cz. siwa 160 cm - 195 cm

### Ilość jaj:

Cz. biała 2 - 5 sztuk, Cz. siwa 3 - 5 sztuk

### Okres wysiadywania jaj:

Cz. biała 25 - 26 dni, Cz. siwa 25 - 26 dni

Długość życia: Cz. siwa około 25 lat

### Najlepszy czas do obserwacji:

Cz. biała marzec - listopad, Cz. siwa praktycznie cały rok

Przeloty: Cz. biała lipiec - grudzień, młode zimują

### Ciekawostki:

Podczas lotu ma charakterystycznie wygiętą szyję w kształcie litery „s”. Pióra czapli były stosowane jako ozdoba damskich kapeluszy. Dzielne zapotrzebowanie na ryby dorosłej czapli siwej wynosi nawet 0,5 kg.



Fot. Leszek Matacz